

Enllaços relacionats

- :: [Workshop](#)
- :: [Twitter @salutcat](#)

Comparteix a...



#

Butlletins de salut



La intervenció dels farmacèutics contribueix a millorar el seguiment dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2



Font : BMJ Open

Tags : farmàcia, diabetis mellitus, tractament

Data de publicació: 06/06/2017

La participació d'un professional farmacèutic en la revisió dels tractaments dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) té un efecte positiu per al seguiment de la malaltia i en els nous processos d'assistència sanitària recomanats pel National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Revisió sistemàtica del tractament de dolor en pacients amb demència i fractura



Font : BMC Geriatrics

Tags : fractura, demència, gent gran

Data de publicació: 01/06/2017

Els pacients amb demència que pateixen una fractura reben menys analgèsia en comparació amb un pacient que no pateix aquesta malaltia.

Diversos factors influeixen en la no adherència als tractaments farmacològics en pacients amb hipertensió arterial



Font : Patient Preference and Adherence

Tags : compliment, malaltia, hipertensió arterial

Data de publicació: 30/05/2017

El perfil sociodemogràfic que registra una adherència superior al tractament és el d'un home d'entre 45 i 65 anys, diagnosticat d'hipertensió fa més de 10 anys, amb estudis superiors i que rep una associació de principis actius en una única presentació.

Enllaços relacionats

- :: [Workshop](#)
- :: [Twitter @salutcat](#)

Comparteix a...



Medicaments i farmàcia

#

Butlletins de salut



la meva
salut
cat@salut

Xarxa virtual d'antídots entre els serveis de farmàcia dels hospitals de Catalunya



"XARXA D'ANTÍDOTS DE CATALUNYA"

GRUP DE TREBALL D'ANTÍDOTS
SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA



Font : Farmàcia Hospitalària
Tags : antídots, intoxicacions, xarxa virtual, toxicologia
Data de publicació: 14/06/2017

Més de 40 hospitals públics i privats catalans s'han adherit a la xarxa creada l'any 2015 i en la qual s'han sol·licitat 9 préstecs d'antídots i rebut 13 consultes toxicològiques.

Polimediació durant l'últim any de vida en pacients de més de 65 anys



Font : American Journal of Medicine
Tags : gent gran, medicaments, polimediació
Data de publicació: 13/06/2017

El percentatge d'adults que pren més de 10 fàrmacs poc abans de morir passa del 30,7 al 47%, sent els analgèsics, antitrombòtics, diürètics, psicolèptics i beta-bloquejants els més habituals.

Efectivitat i seguretat d'anticoagulants orals per a la prevenció d'ictus



Font : Pharmacoepidemiol Drug Saf
Tags : fibril·lació auricular, anticoagulants orals, antiagregants, tromboembolisme
Data de publicació: 09/06/2017

Un estudi liderat per investigadors de Catalunya ha avaluat l'eficàcia i seguretat dels anticoagulants en condicions d'ús real per a la prevenció d'ictus en pacients amb fibril·lació auricular no valvular.